

Ändtarmsundersökning med rektoskopi och/eller proktoskopi

Man gör en ändtarmsundersökning för att undersöka slemhinnan i ändtarmen, titta efter hemorrojder och polyper eller andra förändringar i ändtarmen.

Inför undersökningen

- Du kan äta och dricka som vanligt innan undersökningen.
- För att läkaren ska kunna se slemhinnan brukar man få förbereda sig inför undersökningen genom att ta ett litet lavemang som kallas för **Klyx cirka 2 timmar** innan besöket.

Klyx köper du receptfritt på apoteket inför undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Rektoskopi: Vid en rektoskopi för läkaren ett rörformat plastinstrument cirka 15–25 centimeter in i ändtarmen för att kunna se slemhinnan, eventuella hemorrojder, polyper eller andra förändringar.

Proktoskopi: Vid en proktoskopi används ett kortare rör än vid rektoskopi för att inspektera området precis innanför ändtarmsöppningen. Vid undersökningen kan läkaren upptäcka och behandla eventuella hemorrojder.

Vid ändtarmsundersökning ligger du på vänster sida med knäna uppdragna mot magen. För att lättare kunna inspektera slemhinnan blåser läkaren in luft för att vidga tarmen. Detta kan kännas lite obehagligt men brukar inte göra ont. Ändtarmsundersökning med rektoskopi och/eller proktoskopi tar bara ett par minuter.

Att tänka på

Ta med giltig legitimation till besöket.

Med vänliga hälsningar

Scandinavian Gastro Clinic

*Av- eller ombokning ska ske senast 24 timmar innan besöket och uteblivet besök debiteras. Behöver du boka av ditt besök eller har andra frågor är du välkommen att ringa till oss på **010 55 19 230**. Du kan också skriva till oss i **Vårdrummet** (via vår hemsida) eller mejla till: info@gastroclinic.se*