

### Transitmätning

Undersökningen gäller mätning av passagetiden genom tarmkanalen och avser att mäta om du har fördröjd, normal eller snabb passage genom mag-tarmkanalen.

### Hur går undersökningen till

Mätningen görs med små röntgentäta markörer, som sväljs under sex dagars följd i samband med måltid. På sjunde dagen tas en röntgenbild.

- Under de dagar mätningen pågår bör du inte avvika från dina vanliga kost- och dryckesvanor.
- Tarmretande laxermedel och medel mot diarré skall undvikas under mätperioden.

*Diskutera med din läkare beträffande de mediciner som får tas under mätningen eller om något är oklart.*

Markörerna lämnar kroppen med avföringen och spolas som vanligt ned i toaletten. Det är många faktorer bland annat kost och läkemedel som kan inverka på passagetiden.

Protokollet skall ifyllas dag för dag och medförs till behandlande läkare. Detta underlättar bedömningen av mätningen. Uppgifterna för dag 1 gäller efter sväljning av markörer och för dag 7 före röntgenundersökningen.

### Efter undersökningen

Resultatet av undersökningen och rekommendationer för uppföljning kommer att diskuteras med dig vid ditt uppföljande återbesök.

### Att tänka på

Ta med giltig legitimation till besöket.

Med vänlig hälsning

### Scandinavian Gastro Clinic

*Av- eller ombokning ska ske senast 24 timmar innan besöket och uteblivet besök debiteras. Behöver du boka av ditt besök eller har andra frågor är du välkommen att ringa till oss på **010 55 19 230**. Du kan också skriva till oss i **Vårdrummet** (via vår hemsida) eller mejla till: [info@gastroclinic.se](mailto:info@gastroclinic.se)*