

Sigmoideoskopi

Sigmoideoskopi innebär att man med ett smalt slangliknande instrument med en kamera längst fram undersöker sista delen av tjocktarmen, som även kallas sigmoideum. Man vill se hur slemhinnorna ser ut i tarmen och ibland bestämmer doktorn att det skall tas prover från den under undersökningen.

Inför undersökningen

Du kan äta och dricka som vanligt innan undersökningen men undvik att äta mat som innehåller mycket fibrer och frön veckan innan undersökningen.

För att undersökningen ska gå att utföra är det viktigt att man rengör tarmen. Detta görs med en laxeringsvätska (Klyx) som förs in via ändtarmen och så att slemhinnan blir så ren som möjligt. Doktorn ordnar ett elektroniskt recept på klyx rektallösning som du kan hämta ut på valfritt apotek. Följ instruktionen som står på bipacksedeln i förpackningen. Du skall ta klyxet 1-2 timmar innan undersökningen.

OBS: Om du äter järntabletter bör du sluta ta dem fem dagar innan undersökningen. Om du står på blodförtunnande medicin som Waran eller liknande läkemedel (ej Trombyl) skall du kontakta oss innan undersökningen.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan man uppleva att magen känns spänd och uppblåst på grund av luft blåses in i tarmen. När luften kommer ut brukar obehagen försvinna. Man kan äta och dricka som vanligt direkt efter undersökningen.

Vänliga hälsningar
Scandinavian Gastro Clinic
031 272807
info@scandinaviangastroclinic.se